

## **Систематический список сосудистых растений, встречающихся во время проведения полевой практики на различных экскурсионных маршрутах**

Систематический список составлен с учетом новых данных по таксономической принадлежности растений (Конспект флоры..., 2003, 2006, 2008, 2012; Маевский, 2014). Порядок расположения таксонов близок к использованному в учебнике «Ботаника» А. К. Тимонина с соавторами (2009).

В списке после латинского и русского названий вида приведена его краткая характеристика, которая последовательно включает: тип жизненной формы по И. Г. Серебрякову (1962); тип жизненной формы по К. Раункиеру (Миркин, Наумова, 2012); гигроморфу; тип геоэлемента по Н. Н. Портениеру (2000); фитоценотип; приуроченность к тому или иному высотному поясу, встречаемость, статус (реликт или эндем), практическое использование. В квадратных скобках указаны видовые названия, которые в новой номенклатуре переведены в ранг синонимов, но используются в определительной литературе флоры Кавказа, изданных в предыдущие годы (Гроссгейм, 1949; Косенко, 1970; Зернов, 2006). Жирными цифрами после описания обозначены тематические экскурсии, во время проведения которых можно встретить тот или иной вид. Темы экскурсий приведены в тексте статьи.

### **Сокращения и обозначения:**

Д. – дерево;

К. – кустарник;

Кч. – кустарничек;

Пк. – полукустарник;

Пкч. – полукустарничек;

Л. – лиана;

Мн. – травянистый многолетник;

Дв. – двулетник;

О. – однолетник.

Жирным курсивом и звёздочками перед названием отмечены виды, включенные в Красные книги: \* – виды, включенные в Красную книгу Республики Адыгея (2012); \*\* – виды, включенные в Красную книгу Российской Федерации (2008).

Все виды подкреплены многолетними гербарными сборами, хранящимися в Гербарии им. И. В. Новопокровского кафедры ботаники (RV).

## Отдел LYCOPODIOPHYTA – ПЛАУНОООБРАЗНЫЕ

### Класс Isoëtopsida – Полушниковидные

#### Семейство 1. Selaginellaceae Willk. – Плаунковые

1. (1). *Selaginella selaginoides* (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart. – Плаунок плаунковидный: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; голарктический; лесной; средний пояс; редко; декоративное. **11**.

## Отдел EUISETOPHYTA – ХВОЦЕОБРАЗНЫЕ

### Класс Equisetopsida – Хвоцевидные

#### Семейство 2. Equisetaceae Michx. ex DC – Хвощовые

1. (2). *Equisetum arvense* L. – Хвощ полевой: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; голарктический; прибрежный; от нижнего до субальпийского пояса; часто; ядовитое, лекарственное. **1, 7**.

2. (3). *E. hyemale* L. – Х. зимующий: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; плюрирегиональный; прибрежно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; ядовитое, лекарственное. **1**.

3. (4). *E. palustre* L. – Х. болотный: Мн.; криптофит (геофит или гелофит); мезофит; голарктический; прибрежно-болотный; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; ядовитое, лекарственное. **1, 3, 7**.

4. (5). *E. pratense* Ehrh. – Х. луговой: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; циркумбореальный; прибрежно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; ядовитое, лекарственное. **1, 8**.

## Отдел POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

### Класс Polypodiopsida – Папоротниковидные (Многоножковые)

#### Семейство 3. Onocleaceae E.D.M.Kirchn. – Оноклеевые

1. (6). *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro – Страусник обыкновенный: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; панбореальный; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; реликт; декоративное. **2, 7**.

#### Семейство 4. Woodsiaceae (Diels) Herter (Athyriaceae Alston) – Вудсиевые, или Кочедыжниковые

1. (7). *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – Пузырник ломкий: Мн.; гемикриптофит; мезофит; плюрирегиональный; петрофитный; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **11, 12**.

2. (8). *Rhizomatopteris montana* (Lam.) A. Klokhr. – Корневищник горный: Мн.; криптофит (геофит); гигрофит; панбореальный; петрофитный;

субальпийский пояс; редко. **11.**

3. (9). **\*\**Woodsia fragilis*** (Trevir.) Moore – Вудсия ломкая: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; кавказский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; эндем; декоративное. **4.**

#### Семейство 5. Dryopteridaceae Herter – Щитовниковые

1. (10). *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Н.Р. Fuchs – Щитовник картузианский: Мн.; гемикриптофит; мезофит; циркумбореальный; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно, декоративное. **2, 3.**

2. (11). *D. filix-mas* (L.) Schott. – Щ. мужской: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; часто; лекарственное, декоративное. **2.**

3. (12). *Polystichum braunii* Fee. – Многорядник Брауна: Мн.; гемикриптофит; мезофит; панбореальный; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; изредка; декоративное. **2.**

#### Семейство 6. Aspleniaceae A.B. Frank – Костенцовые

1. (13). **\*\**Asplenium adiantum-nigrum*** L. – Костенец черный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; плюрирегиональный; луговой; средний пояс; изредка; декоративное. **11.**

2. (14). *A. ruta-muraria* L. – К. рута постенная: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; голарктический; луговой; от низменности до субальпийского пояса; изредка; декоративное. **11.**

3. (15). *A. septentrionale* (L.) Hoffm – К. северный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; субальпийский; от нижнего до альпийского пояса; изредка; декоративное. **11, 12.**

4. (16). *A. trichomanes* L. – К. волосовидный: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; плюрирегиональный; петрофитный; от нижнего до альпийского пояса; рассеянно; декоративное. **11, 12.**

5. (17). *A. viride* Huds. – К. зеленый: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; голарктический; субальпийский; от нижнего до альпийского пояса; редко; декоративное. **11, 12.**

6. (18). *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm – Листовник сколопендровый: Мн.; гемикриптофит; гигрофит; голарктический; лесной; лапишистофит; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **2, 11.**

#### Семейство 7. Polypodiaceae J.Presl & C.Presl – Многоножковые

1. (19). *Polypodium vulgare* L. – Многоножка обыкновенная: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; плюрирегиональный; петрофитно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративный. **11.**

Отдел SPERMATOPHYTA – СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Класс Pinopsida (Coniferae) – Хвойные (Шишконосные)

Семейство 8. Pinaceae Lindl. – Сосновые

1. (20). *Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – Пихта Нордмана: Д.; фанерофит; мезофит; эвксинский; лесной; верхний лесной пояс; обычно; реликт; техническое, лекарственное, декоративное. **5.**

2. (21). *Pinus kochiana* Klotzsch ex C. Koch – Сосна Коха: Д.; фанерофит; ксерофит; кавказский; лесной; от среднего до субальпийского пояса; часто; декоративное. **4.**

Семейство 9. Cupressaceae Rich. ex Bartl – Кипарисовые

1. (22). *Juniperus communis* ssp. *hemisphaerica* (J. et C. Presl) Nym. – Можжевельник полушаровидный: вечнозеленый стланиковый К.; хамефит; ксерофит; европейско-средиземноморский; петрофитный; от среднего до альпийского пояса, рассеянно; декоративное, лекарственное. **12.**

2. (23). \**J. sabina* L. – М. казацкий: вечнозеленый стланиковый К.; хамефит; ксерофит; евро-сибирский; лесной; от среднего до альпийского пояса; редко; ядовитое, декоративное. **5, 12.**

Семейство 10. Taxaceae Gray – Тисовые

1. (24). \*\**Taxus baccata* L. – Тис ягодный: Д.; фанерофит; мезофит; палеарктический; лесной; от среднего до верхнего лесного пояса; изредка; реликт; декоративное, ядовитое. **6.**

Класс Magnoliopsida (Angiospermae) – Покрытосеменные (Цветковые)

Dicotyledones s. l. – Двудольные

Семейство 11. Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые

1. (25). *Aristolochia clematitis* L. – Кирказон ломоносовидный: Мн.; криптофит; мезофит; кавказско-европейский; лугово-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; лекарственное. **2, 3, 7.**

2. (26). *Asarum caucasicum* (Duch.) N. Busch. [*Asarum intermedium* (С.А. Меу.) Grossh.] – Копытень кавказский: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-эвксинский; лесной; средний пояс; обычно; лекарственное. **2, 3, 4, 7.**

Семейство 12. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые

1. (27). *Aconitum nasutum* Fisch. ex Reichb. – Борец носатый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-эвксинский; лугово-лесной; от верхнего до субальпийского пояса; обычно; эндем; ядовитое. **10.**

2. (28). *A. orientale* Mill. – Б. восточный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; луговой; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; ядовитое. **10.**

3. (29). *Anemone fasciculata* L. – Ветреница пучковатая: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-европейский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; обычно; декоративное. **10, 12.**

4. (30). *Aquilegia olympica* Boiss. – Водосбор олимпийский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; опушечно-луговой; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **10.**

5. (31). *Clematis vitalba* L. – Ломонос виноградолистный: деревянистая Л.; фанерофит; мезофит; средиземноморский; опушечно-лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **4.**

6. (32). *Delphinium dasycarpum* Stev. ex DC. – Живокость опушенноплодная: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; опушечно-луговой; от верхнего до субальпийского пояса; обычно; эндем; ядовитое. **9.**

7. (33). *Ficaria verna* Huds. – Чистяк весенний: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; западно-палеарктический; опушечно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; ядовитое, декоративное. **1, 2.**

8. (34). \**Helleborus caucasicus* C. Koch ex A. Br. [*H. orientalis* Lam. s.l.] – Морозник кавказский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; эвксинский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; лекарственное, декоративное, ядовитое. **2, 3.**

9. (35). *Ranunculus caucasicus* Vieb. – Лютик кавказский: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; от среднего до субальпийского пояса; обычно; эндем; реликт; ядовитое. **8.**

10. (36). *R. polyanthemos* L. – Л. многоцветковый: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; евро-сибирский; лугово-степной; от нижнего до среднего пояса; обычно; медоносное. **1, 8.**

11. (37). *R. repens* L. – Л. ползучий: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; евро-сибирский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; ядовитое. **1, 7.**

12. (38). *Thalictrum foetidum* L. – Василистник вонючий: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; палеарктический; петрофитно-степной; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; ядовитое. **8, 9.**

13. (39). *Th. minus* L. – В. малый: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; палеарктический; лугово-степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; ядовитое. **1, 9.**

Семейство 13. Polygonaceae Juss. – Гречишные

1. (40). *Bistorta carnea* (C. Koch) Kom. [*Polygonum carneum* C. Koch]– Змеевик мясо-красный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; опушечно-луговой; от субальпийского до альпийского пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **10, 12.**

2. (41). *B. vivipara* (L.) Delarbre [*Polygonum viviparum* L.] – З. живородящий: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; рассеянно; лекарственное. **10, 12.**

3. (42). *Polygonum aviculare* L. – Горец птичий: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; лекарственное. **1, 9.**

4. (43). *Rumex acetosa* L. – Щавель кислый: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; голарктический; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; кормовое. **1, 9.**

5. (44). *R. acetosella* L. – Щ. обыкновенный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; голарктический; петрофитный; от нижнего до альпийского пояса; рассеянно; декоративное. **1, 9, 10.**

6. (45). *R. alpinus* L. – Щ. альпийский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-европейский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; обычно; лекарственное. **10, 12.**

7. (46). *R. confertus* Willd. – Щ. конский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; кормовое. **1, 8, 9.**

8. (47). *R. crispus* L. – Щ. курчавый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; голарктический; сорно-лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; кормовое. **1, 8, 9.**

9. (48). *R. scutatus* L. [*R. alpestris* Jacq.] – Щ. щитовидный, или приальпийский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; изредка. **8, 10.**

#### Семейство 14. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные

1. (49). *Cerastium arvense* L. – Ясколка полевая: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; голарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **8, 9, 10.**

2. (50). *Dianthus armeria* L. – Гвоздика армериевидная: О.; терофит; ксеромезофит; кавказско-европейский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **11.**

3. (51). *Gypsophila tenuifolia* Vieb. – Качим тонколиственный: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; кавказский; петрофитный; от субальпийского до альпийского пояса; часто; эндем; декоративное. **11, 12.**

4. (52). *Silene compacta* Fisch. – Смолёвка скученноцветковая: Дв.; гемикриптофит; мезофит; ирано-туранский; луговой; от среднего до субальпийского пояса; нередко; декоративное. **8, 10, 11.**

5. (53). *S. pratensis* (Rafn) Godr. [*Melandrium album* (Mill.) Garcke] – С. луговая, Дрёма белая: О. или Дв.; терофит или гемикриптофит; мезофит; понтичеко-южносибирский; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное, кормовое. **1, 9.**

6. (54). *S. saxatilis* Sims. – С. наскальная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; обычно; эндем; декоративное. **10, 11.**

7. (55). *S. wolgensis* (Hornem.) Besser ex Spreng. – С. волжская: Дв.; гемикриптофит; ксерофит; понтичеко-южносибирский; петрофитно-степной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно. **9, 10, 11.**

8. (56). *Stellaria graminea* L. – Звездчатка злаковидная: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративный. **8, 10.**

#### Семейство 15. Santalaceae R. Br. – Санталовые

1. (57). *Viscum album* L. – Омела белая: полупаразитный вечнозелёный Кч.; фанерофит; мезофит; палеарктический; опушечный; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное. **1, 2.**

#### Семейство 16. Paeoniaceae Raf. – Пионовые

1. (58). **\*\**Paeonia caucasica*** (Schipcz.) Schipcz. – Пион кавказский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; эвксинский; опушечно-лесной; от среднего до субальпийского пояса; редко; эндем; декоративное. **2, 4.**

#### Семейство 17. Crassulaceae J.St.-Hil. – Толстянковые

1. (59). *Sedum acre* L. – Очиток едкий: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; кавказско-европейский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; часто; декоративное. **11.**

2. (60). *S. gracile* С.А. Mey. – О. тонкий: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; кавказский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; редко; декоративное. **11.**

3. (61). *S. hispanicum* L. – О. испанский: О. или Дв.; терофит или гемикриптофит; мезоксерофит; средиземноморский; петрофитный; от среднего до субальпийского пояса; редко; декоративное. **11, 12.**

4. (62). *S. maximum* var. *causicum* Grossh. – Очитник кавказский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; петрофитный; от среднего до субальпийского пояса; обычно; эндем; декоративное. **11, 12.**

5. (63). *S. spurium* Vieb. – Очиток ложный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-эвксинский; лесной; субальпийский пояс; рассеянно; реликт; декоративное. **11, 12.**

6. (64). *S. stoloniferum* S.G. Gmel. – О. побегоносный: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; кавказский; петрофитный; от среднего до субальпийского пояса; обычно; реликт; декоративное. **11, 12.**

7. (65). *S. tenellum* Vieb. – О. тоненький: Пкч.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитный; от субальпийского до альпийского пояса; редко; декоративное. **12.**

8. (66). *Sempervivum caucasicum* Rupr. ex Boiss. – Молодило кавказское: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; кавказский; петрофитный; от среднего до субальпийского пояса; нередко; эндем; декоративное. **11, 12.**

9. (67). *Umbilicus oppositifolius* (Ledeb.) Ledeb. – Пупочная трава супротивнолистная: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; эвксинский; лесной; от среднего до субальпийского пояса; обычно; эндем; реликт; декоративное. **11, 12.**

#### Семейство 18. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые

1. (68). *Chrysosplenium dubium* J. Gay ex Ser. – Селезёночник сомнительный: Мн.; гемикриптофит; гигрофит; субсредиземноморский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт. **2, 3.**

2. (69). *Saxifraga cartilaginea* Willd – Камнеломка хрящеватая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитный; средний пояс; часто; эндем; декоративное. **11.**

3. (70). *S. cymbalaria* L. – К. кимвальная: О.; терофит; гигрофит; средиземноморский; петрофитный; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; декоративное. **11.**

4. (71). *S. juniperifolia* Adam. – К. можжевелолистная: Мн.; хамефит; мезоксерофит; кавказский; петрофитный; от субальпийского до альпийского пояса; рассеянно; эндем; декоративное. **12.**

5. (72). *S. rotundifolia* L. – К. круглолистная: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; кавказско-армено-иранский; петрофитный; средний пояс; рассеянно; декоративное. **11.**

#### Семейство 19. Geraniaceae Juss. – Гераниевые

1. (73). *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – Журавельник цикутовый: О.; терофит; ксеромезофит; палеарктический; сорный; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **1, 9.**

2. (74). *Geranium gymnocaulon* DC. – Герань голостебельная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; субальпийский пояс; обычно;

эндем; декоративное. **10, 12.**

3. (75). *G. robertianum* L. – Г. Роберта: О. или Дв.; терофит или гемикриптофит; мезофит; палеарктический; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; реликт. **2, 3, 6.**

4. (76). *G. sanguineum* L. – Г. кроваво-красная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **1, 8.**

#### Семейство 20. Onagraceae Juss. – Кипрейные

1. (77). *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. – Иван-чай узколистный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; опушечный; от нижнего до верхнего лесного пояса; изредка; лекарственное. **4, 7.**

2. (78). *Circaea lutetiana* L. – Двулепестник парижский: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; лесной; от среднего до субальпийского пояса; обычно; реликт; медоносное. **10, 12.**

3. (79). *Epilobium montanum* L. – Кипрей горный: Мн.; гемикриптофит; гигрофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; реликт. **12.**

4. (80). *Oenothera biennis* L. – Ослиник двулетний: Дв.; гемикриптофит; мезоксерофит; плюрирегиональный; сорно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; изредка; декоративное. **8, 9.**

#### Семейство 21. Leguminosae Juss., nom. altern. (Fabaceae Lindl.) – Бобовые

1. (81). *Astragalus glycyphyllos* L. – Астрагал солодколистный: Мн.; криптофит (геофит); гигромезофит; евро-сибирский; опушечно-лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; лекарственное. **2, 3.**

2. (82). *Coronilla varia* L. – Вязель пёстрый: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; кавказско-европейский; луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; ядовитое, медоносное. **1, 4, 8.**

3. (83). *Galega officinalis* L. – Козлятник лекарственный: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; кавказско-европейский; лугово-лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; лекарственное. **8, 10.**

4. (84). *G. orientalis* Lam. – К. восточный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; лугово-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; лекарственное. **8, 10.**

5. (85). *Lathyrus aureus* (Steven ex Fisch. & C.A. Mey.) D. Brândză – Чина золотистая: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно. **2, 4, 6.**

6. (86). *L. nissolia* L. – Ч. Ниссоля: О.; терофит; мезоксерофит; западно-палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно;

декоративное. **9.**

7. (87). *L. roseus* Stev. – Ч. розовая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-эвксинский; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно. **8.**

8. (88). *Lotus corniculatus* L. – Лядвенец рогатый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **1, 8, 9.**

9. (89). *L. graecus* L. – Л. греческий: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **10.**

10. (90). *Medicago falcata* L. – Люцерна серповидная: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; палеарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; кормовое. **1, 8, 9.**

11. (91). *M. lupulina* L. – Л. хмелевидная: О. или Дв.; терофит или гемикриптофит; мезофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно. **1, 8, 9.**

12. (92). *Melilotus albus* (L.) Medik. – Донник белый: Дв.; гемикриптофит; мезоксерофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; лекарственное, кормовое. **8, 9.**

13. (93). *M. officinalis* (L.) Pall. – Д. лекарственный: Дв.; гемикриптофит; мезоксерофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; лекарственное, кормовое. **8, 9.**

14. (94). *Trifolium arvense* L. – Клевер пашенный: О.; терофит; ксеромезофит; западно-палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; кормовое, декоративное. **1, 9.**

15. (95). *T. aureum* Pollich – К. золотистый: О.; терофит; мезофит; кавказско-европейский; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; часто; декоративное. **8, 9.**

16. (96). *T. canescens* Willd. – К. седоватый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; субальпийский пояс; обычно; кормовое. **10, 12.**

17. (97). *T. polyphyllum* С.А.Мей – К. многолистный: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; кавказско-эвксинский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; рассеянно; эндем; кормовое. **10, 12.**

18. (98). *T. pratense* L. – К. луговой: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; кормовое. **8, 9.**

19. (99). *Vicia alpestris* Stev. – Горошек горный: Мн.; криптофит; мезофит; кавказский; луговой; субальпийский пояс; обычно; кормовое. **10, 12.**

20. (100). *V. cracca* L. – Г. мышинный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; палеарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно;

кормовое. **8, 9.**

Семейство 22. Rosaceae Juss. – Розоцветные

1. (101). *Agrimonia eupatoria* L. – Репешок аптечный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **1, 8.**

2. (102). *Alchemilla retinervis* Bus. – Манжетка сетчатожилковая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитно-луговой; от среднего до альпийского пояса; рассеянно; декоративное. **11, 12.**

3. (103). *Aruncus vulgaris* Rafin. – Волжанка обыкновенная: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **2, 4, 6.**

4. (104). *Cerasus avium* (L.) Moench [*Prunus avium* L.] – Вишня птичья, черешня: Д.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; пищевое. **7.**

5. (105). *Cotoneaster integerrimus* Medikus – Кизильник цельнокрайний: К.; хамефит; мезофит; евро-сибирский; лесной; от среднего до субальпийского пояса; редко; декоративное. **6, 12.**

6. (106). *Crataegus monogyna* Jacq. – Боярышник одностолбиковый: Д.; фанерофит; мезоксерофит; кавказско-европейский; лугово-лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **4, 7.**

7. (107). *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный: Мн.; криптофит (геофит); гигрофит; евро-сибирский; лугово-болотный; от среднего до субальпийского пояса; обычно; декоративное, лекарственное, медоносное. **8, 9.**

8. (108). *F. vulgaris* Moench. – Л. обыкновенный: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; евро-сибирский; луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; декоративное, лекарственное, медоносное. **8, 9.**

9. (109). *Fragaria vesca* L. – Земляника обыкновенная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; лугово-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; пищевое, декоративное. **2, 11.**

10. (110). *F. viridis* Duch. – З. зеленая: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; евро-сибирский; лугово-степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; пищевое. **9.**

11. (111). *Geum latilobum* Somm. et Levier. – Гравилат широколопастный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; эвксинский; луговой; от верхнего до субальпийского пояса; рассеянно. **10, 12.**

12. (112). *G. rivale* L. – Г. речной: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; голарктический; лесной; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно;

декоративное. **10, 12.**

13. (113). *G. urbanum* L. – Г. городской: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; лугово-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; медоносное. **7.**

14. (114). *Malus orientalis* Uglizk. – Яблоня восточная: Д.; фанерофит; мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; пищевое. **2, 4, 7.**

15. (115). *Potentilla argentea* L. – Лапчатка серебристая: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; евро-сибирский; лугово-степной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **8, 9.**

16. (116). *P. erecta* (L.) Raeusch. – Л. прямостоячая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; лугово-лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное. **1, 8.**

17. (117). *P. recta* L. – Л. прямая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; мезоксерофит; палеарктический; лугово-степной; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **8, 9.**

18. (118). *P. reptans* L. – Л. ползучая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное. **7, 8.**

19. (119). *Prunus cerasifera* Ehrh. – Слива растопыренная, алыча: Д.; фанерофит; мезофит; общедревнесредиземноморский; опушечно-лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; пищевое. **7.**

20. (120). *P. laurocerasus* L. – Лавровишня лекарственная: Д. или К.; фанерофит; мезофит; гиркано-эвксинский; лесной; верхний пояс; редко; лекарственное. **3, 5, 6.**

21. (121). *P. spinosa* L. – С. колючая, терн: К.; фанерофит; мезоксерофит; кавказско-европейский; опушечно-степной; от нижнего до среднего пояса; обычно; пищевое, лекарственное. **4, 8.**

22. (122). *Pyrus caucasica* Fed. – Груша кавказская: Д.; фанерофит; мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; пищевое. **3, 4, 7.**

23. (123). *Rosa canina* L. – Шиповник собачий: К.; фанерофит; мезоксерофит; палеарктический; опушечный; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **4, 8.**

24. (124). *Rubus caesius* L. – Ежевика: К.; фанерофит; мезофит; палеарктический; опушечно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; пищевое. **2, 3, 7.**

25. (125). *Sorbus aucuparia* L. – Рябина обыкновенная: Д.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного

пояса; редко; декоративное, лекарственное, пищевое. **3, 7.**

26. (126). *S. torminalis* (L.) Crantz. – Р. глоговина: Д.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **4.**

#### Семейство 23. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые

1. (127). *Rhamnus microcarpa* Vnoiss. – Жостер мелкоплодный: К.; фанерофит; мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; лекарственное. **4.**

#### Семейство 24. Ulmaceae Mirb. – Вязовые

1. (128). *Ulmus glabra* Huds. – Вяз шершавый: Д.; фанерофит; мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; техническое. **7.**

2. (129). *U. minor* Mill. – В. малый: Д.; фанерофит; мезоксерофит; палеарктический; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; техническое, декоративное. **7.**

#### Семейство 25. Urticaceae Juss. – Крапивные

1. (130). *Urtica dioica* L. – Крапива двудомная: Мн.; криптофит; гигромезофит; голарктический; опушечно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **4, 7, 9, 10.**

#### Семейство 26. Fagaceae Dumort. – Буковые

1. (131). *Fagus orientalis* Lipsky. – Бук восточный: Д.; фанерофит; мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; техническое, пищевое, ядовитое. **2, 3.**

2. (132). *Quercus hartwissiana* Stev. – Дуб Гартвиса: Д.; фанерофит; мезофит; эвксинский; лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; реликт; техническое. **2, 4, 6.**

3. (133). *Q. petraea* L. ex Liebl. – Д. скальный: Д.; фанерофит; ксеромезофит; кавказско-европейский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; реликт; декоративное. **4.**

4. (134). *Q. petraea* ssp. *iberica* (Steven ex Vieb.) Krassiln [*Q. iberica* Stev. ex Vieb.] – Д. грузинский: Д.; фанерофит; мезофит; понтический; лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; эндем; реликт; декоративное. **4.**

5. (135). *Q. robur* L. – Д. черешчатый: Д.; фанерофит; ксеромезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; техническое. **4.**

6. (136). *Q. rubra* L. – Д. красный: Д.; фанерофит; мезофит; кавказско-

европейский; лесной; от нижнего до среднего пояса; редко; декоративное. **4.**

#### Семейство 27. Betulaceae Gray – Берёзовые

1. (137). *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – Ольха черная, клейкая: Д.; фанерофит; гигромезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; лекарственное, техническое. **2, 7.**

2. (138). *A. incana* (L.) Moench – О. серая: Д.; фанерофит; мезофит; панбореальный; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; техническое. **2, 7.**

3. (139). *Betula litwinowii* Doluch. – Берёза Литвинова: Д.; фанерофит; мезофит; кавказский; субальпийский; от верхнего лесного до субальпийского пояса; обычно; техническое. **12.**

4. (140). *B. pendula* Roth. – Б. повислая: Д.; фанерофит; мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до среднего лесного пояса; изредка; техническое, лекарственное, декоративное. **2.**

5. (141). *Carpinus betulus* L. – Граб обыкновенный: Д.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; техническое. **2, 3, 6, 7.**

6. (142). *C. orientalis* Mill. – Г. восточный, или грабинник: Д.; фанерофит; мезофит; средиземноморский; лесной; средний пояс; часто; декоративное. **2, 3.**

7. (143). *Corylus avellana* L. – Лещина обыкновенная: К.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; пищевое. **2, 3, 7.**

8. (144). **\*\**Ostrya carpinifolia*** Scop. – Хмелеграб обыкновенный: Д.; фанерофит; мезофит; средиземноморский; лесной; средний пояс; редко; декоративное. **2, 4.**

#### Семейство 28. Aquifoliaceae DC. ex. A. Rich. – Падубовые

1. (145). **\**Ilex colchica*** Rojark. – Падуб колхидский: вечнозеленый К.; фанерофит; мезофит; эвксинский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; изредка; реликт; декоративное. **2, 3, 6.**

#### Семейство 29. Celastraceae R.Br. – Бересклетовые

1. (146). *Euonymus europaea* L. – Бересклет европейский: К.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; ядовитое. **2, 3, 5, 7.**

2. (147). **\**E. leiophloeus*** Stev. – Б. гладкокорый: К.; фанерофит; мезофит; эвксинский; лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; эндем; ядовитое. **2, 4.**

3. (148). *E. verrucosa* Scop. – Б. бородавчатый: К.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; ядовитое. **2, 3, 5.**

#### Семейство 30. Oxalidaceae R.Br. – Кисличные

1. (149). *Oxalis acetosella* L. – Кислица обыкновенная: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; пищевое. **2, 5.**

#### Семейство 31. Violaceae Batsch – Фиалковые

1. (150). *Viola arvensis* Murr. – Фиалка полевая: О.; терофит; ксеромезофит; палеарктический; сорно-степной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное, лекарственное. **1, 9.**

2. (151). *V. montana* L. – Ф. горная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; лугово-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; декоративное. **10.**

3. (152). *V. odorata* L. – Ф. душистая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; декоративное. **2, 6, 10.**

#### Семейство 32. Salicaceae Mirb. – Ивовые

1. (153). *Populus tremula* L. – Осина: Д.; фанерофит; мезофит; евро-сибирский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; техническое, лекарственное, декоративное. **2, 3, 7.**

2. (154). *Salix alba* L. – Ива белая: Д.; фанерофит; мезофит; евро-сибирский; прибрежно-водный; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **7.**

3. (155). *S. caprea* L. – И. козья: Д.; фанерофит; мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; декоративное. **7.**

4. (156). *S. cinerea* L. – И. пепельная: К.; фанерофит; гигрофит; палеарктический; прибрежно-водный; от нижнего до среднего пояса; редко; техническое. **7.**

#### Семейство 33. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные

1. (157). *Euphorbia macroceras* Fisch. et C.A. Mey. – Молочай длиннорогий: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; лугово-лесной; от верхнего лесного до субальпийского пояса; обычно; эндем; реликт. **10, 12.**

2. (158). *E. palustris* L. – М. болотный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; западно-палеарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; редко; ядовитое. **8.**

3. (159). *E. petrophila* C.A. Mey – М. скалолюбивый: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; эвксинский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; редко; эндем; декоративное. **11**.

4. (160). *E. stricta* L. – М. прямой: О.; терофит; ксеромезофит; кавказско-европейский; сорный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; ядовитое. **9**.

5. (161). *E. procera* Bieb. [*E. villosa* Waldst. et Kit.] – М. мохнатый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; прибрежно-луговой; от нижнего до среднего пояса, рассеянно; ядовитое. **7, 8**.

#### Семейство 34. Linaceae DC. ex Perleb – Льновые

1. (162). *Linum hypericifolium* Salisb. – Лён зверобоелистный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; опушечно-луговой; субальпийский пояс; обычно; декоративное. **10**.

#### Семейство 35. Hypericaceae Juss. – Зверобойные

1. (163). *Hypericum perforatum* L. – Зверобой продырявленный: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; западно-палеарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; лекарственное. **1, 9**.

#### Семейство 36. Brassicaceae Burnett – Капустные

1. (164). *Alyssum murale* Waldst. et Kit – Бурачок стенной: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; средиземноморский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; часто; декоративное. **11**.

2. (165). *A. tortuosum* Waldst. & Kit. ex Willd. – Б. извилистый: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; восточносредиземноморский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **11**.

3. (166). *A. trichostachyum* Rupr. – Б. пушистый: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; восточносредиземноморский; петрофитный; субальпийский пояс; часто; эндем; декоративное. **11, 12**.

4. (167). *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – Резушка Таля: О. или Дв.; терофит или гемикриптофит; мезофит; палеарктический; сорный; от нижнего до среднего пояса; обычно. **1, 9**.

5. (168). *Arabis caucasica* Schlecht. – Резуха кавказская: Мн.; гемикриптофит; мезофит; ирано-туранский; петрофитный; от среднего до альпийского пояса; часто; эндем; декоративное. **11, 12**.

6. (169). *Barbarea minor* C. Koch. – Сурепка малая: О.; терофит; мезофит; ирано-туранский; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; кормовое. **1, 9**.

7. (170). *Cardamine impatiens* L. – Сердечник недотрога: О. или Дв.; терофит или гемикриптофит; гигромезофит; палеарктический; лесной; от

среднего до субальпийского пояса; обычно; реликт. **5, 6.**

8. (171). *C. uliginosa* Vieb. – С. болотный: Мн.; гемикриптофит; мезогигрофит; ирано-туранский; болотный; от среднего до субальпийского пояса; редко; эндем; лекарственное. **7, 10.**

9. (172). *Erysimum repandum* L. – Желтушник выгрызенный: О.; терофит; мезоксерофит; общедревнесредиземноморский; сорно-степной; от нижнего до среднего пояса; обычно. **1, 9.**

10. (173). *Hesperis matronalis* L. – Вечерница ночная фиалка: Дв.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; эндем; декоративное, медоносное. **2, 3, 6.**

11. (174). *H. ruscotricha* Vornb. et Degen – В. густоволосистая: Дв.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **2, 3, 4.**

12. (175). *H. voronovii* Busch. – В. Воронова: Дв.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; лесной; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; эндем; декоративное. **4, 6.**

13. (176). *Iberis taurica* DC. – Иберийка крымская: Дв.; гемикриптофит; ксерофит; ирано-туранский; петрофитно-степной; от субальпийского до альпийского пояса; нередко; эндем; декоративное. **10, 12.**

14. (177). *Pachyphragma macrophyllum* (Hoffm.) N. Busch – Толстостенка крупнолистная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-эвксинский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; декоративное. **2, 3, 7.**

15. (178). *Sisymbrium loeselii* L. – Гулявник Лёзеля: О.; терофит; мезофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно. **1, 9.**

16. (179). *Thlaspi perfoliatum* L. – Ярутка пронзённолистная: О.; терофит; ксеромезофит; западно-палеарктический; сорно-лугово-степной; от нижнего до среднего пояса; обычно. **1, 8, 9.**

#### Семейство 37. Cistaceae Juss. – Ладанниковые

1. (180). *Helianthemum ciscaucasicum* Juz. & Pozdeeva – Солнцецвет предкавказский: Пкч.; хамефит; мезофит; кавказско-европейский; петрофитный; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **11, 12.**

2. (181). *H. nummularium* (L.) Mill. – С. монетчатый: Пкч.; хамефит; ксерофит; кавказско-европейский; петрофитный; от субальпийского до альпийского пояса; рассеянно; декоративное. **11, 12.**

#### Семейство 38. Tiliaceae Juss. – Липовые

1. (182). *Tilia platyphyllos* ssp. *caucasica* (Rupr.) Loria [*T. begoniifolia*

Steven, *T. caucasica* Rupr.] – Липа кавказская: Д.; фанерофит; мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; эндем; реликт; медоносное, лекарственное, декоративное. **4, 5, 7.**

#### Семейство 39. Malvaceae Juss. – Мальвовые

1. (183). *Alcea rugosa* Atef. – Шток-роза морщинистая: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; понтичеко-южносибирский; лугово-степной; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное, медоносное. **1, 8.**

2. (184). *Lavatera thuringiaca* L. – Хатма тюрингенская: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; палеарктический; лугово-степной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **1, 8.**

#### Семейство 40. Aceraceae Juss. – Клёновые

1. (185). *Acer campestre* L. – Клён полевой: Д.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; техническое, декоративное. **2, 3, 7.**

2. (186). *A. laetum* С.А. Меу – К. красивый: Д., фанерофит; гигромезофит; кавказский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; часто; реликт; декоративное. **2, 4.**

3. (187). *A. pseudoplatanus* L. – К. ложноплатановый: Д.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до альпийского пояса; изредка; декоративное. **2, 3.**

4. (188). *A. platanoides* L. – К. остролистный: Д.; фанерофит; мезофит; лесной; кавказско-европейский; от нижнего до среднего пояса; обычно; техническое, декоративное. **2, 4**

5. (189). *A. trautvetteri* Medw. – К. Траутфеттера: Д.; фанерофит; мезофит; кавказско-эвксинский; лесной; субальпийский пояс; рассеянно; эндем; реликт; декоративное. **10, 12.**

#### Семейство 41. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые

1. (190). *Impatiens noli-tangere* L. – Недотрога обыкновенная: О.; терофит; гигрофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **2, 3, 6.**

#### Семейство 42. Primulaceae Batsch ex Borkh. – Первоцветные

1. (191). *Anagallis arvensis* L. – Очный цвет полевой: О. или Дв.; терофит или гемикриптофит; мезоксерофит; палеарктический; прибрежно-луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; медоносный, ядовитый. **1.**

2. (192). *Cyclamen coum* subsp. *caucasicum* (С. Koch.) О. Schwarz – Цикламен кавказский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; лесной;

от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; эндем; реликт; декоративное. **4, 5, 7.**

3. (193). *Lysimachia verticillaris* Biehler – Вербейник мутовчатый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; лугово-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; медоносное, декоративное. **2, 3, 6, 10.**

4. (194). *Primula macracalyx* Bunge. – Первоцвет крупночашечковый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; лугово-лесной; от среднего до субальпийского пояса; обычно; декоративное, медоносное, витаминное, лекарственное. **12.**

5. (195). *P. ruprechtii* Kusun. – П. Рупрехта: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитно-луговой; от субальпийского до альпийского пояса; обычно; эндем; декоративное. **12.**

6. (196). *P. vulgaris* Huds. – П. обыкновенный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; средиземноморский; лесной; от нижнего до среднего пояса; изредка; декоративное. **2, 6.**

#### Семейство 43. Ericaceae Juss. – Вересковые

1. (197). *Pyrola rotundifolia* L. – Грушанка круглолистная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; лесной; от среднего до субальпийского пояса; редко; лекарственное. **2.**

2. (198). *Rhododendron caucasicum* Pall. – Рододендрон кавказский: К.; фанерофит; мезофит; кавказско-эвксинский; курстарниковый; от субальпийского до альпийского пояса; часто; реликт; декоративное. **12.**

3. (199). *Rh. luteum* Sweet – Р. желтый: К.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от среднего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; декоративное. **2, 3, 5.**

4. (200). *Rh. ponticum* L. – Р. понтийский: К.; фанерофит; гигромезофит; эвксинский; лесной; от среднего до верхнего лесного пояса; изредка; реликт; декоративное. **2, 3, 4.**

5. (201). *Vaccinium arctostaphylos* L. – Черника кавказская: К.; фанерофит; мезофит; гиркано-эвксинский; лесной; от среднего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; пищевое. **4, 5.**

6. (202). *V. myrtillus* L. – Ч. обыкновенная: К.; хамефит; мезофит; евро-сибирский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; изредка; пищевое. **12.**

#### Семейство 44. Cornaceae Bercht. & J.Presl – Кизилы

1. (203). *Cornus mas* L. – Кизил обыкновенный: К.; фанерофит; мезофит; субсредиземноморский; лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; пищевое. **2, 4, 7.**

2. (204). *Swida australis* (C. A. Mey) Pojark. [*Cornus australis* C. A. Mey.] – Свидина южная: К.; фанерофит; мезофит; общедревнесредиземноморский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; лекарственное. **2, 4, 7.**

#### Семейство 45. Hydrangeaceae Dumort. – Гортензиевые

1. (205). *Philadelphus caucasicus* Koehne – Чубушник кавказский: К.; фанерофит; мезофит; общедревнесредиземноморский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; декоративное. **2, 3, 5, 7.**

#### Семейство 46. Araliaceae Juss. – Аралиевые

1. (206). *Hedera colchica* C. Koch – Плющ колхидский: деревянистая Л.; фанерофит; гигромезофит; эвксинский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; декоративное. **2, 4.**

2. (207). *H. helix* L. – П. обыкновенный: деревянистая Л.; фанерофит; мезофит; общедревнесредиземноморский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; редко; реликт; декоративное. **2, 3, 4.**

#### Семейство 47. Apiaceae Lindl. – Зонтичные

1. (208). *Aegopodium podagraria* L. – Сныть лесная: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное. **2, 3, 4.**

2. (209). *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. – Купырь лесной: Дв.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; опушечно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **2, 3, 4.**

3. (210). *Vupleurum falcatum* L. – Володушка серповидная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; опушечно-луговой; от среднего до субальпийского пояса; нередко; декоративное. **6, 12.**

4. (211). *Chaerophyllum aureum* L. – Бутень золотистый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-европейский; опушечный; от среднего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **8, 10.**

5. (212). *Chamaescidium acaule* (Vieb) Boiss. – Низкозонтичник бесстебельный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитный; альпийский пояс; обычно; эндем; реликт. **11, 12.**

6. (213). *Conium maculatum* L. – Болиголов пятнистый: Дв.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; изредка; ядовитое. **8, 9.**

7. (214). *Daucus carota* L. – Морковь дикая: Дв.; гемикриптофит; мезоксерофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; медоносное. **1, 8, 9.**

8. (215). *Eryngium planum* L. – Синеголовник плоский: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; понтичско-южносибирский; степной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **9.**

9. (216). *Heracleum mantegazzianum* Somm. – Борщевик Мантегацци: Дв.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-эвксинский; лугово-лесной; средний пояс; обычно; эндем; реликт; ядовитое. **8, 9.**

10. (217). *H. sibiricum* L. – Б. сибирский: Дв.; гемикриптофит; ксеромезофит; палеарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; редко; лекарственное. **9, 10.**

11. (218). *Laser trilobum* (L.) Borkh. – Лазурник трехлопастной: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно. **4.**

12. (219). *Pastinaca armena* Fisch. et Mey – Пастернак армянский: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; пищевое. **10, 12.**

13. (220). *Pimpinella tripartita* Kalen. – Бедренец трёхраздельный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; лесной; средний пояс; рассеянно; лекарственное. **6.**

14. (221). *Seseli petraeum* Vieb. – Жабрица щербистая: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; кавказский; понтичско-южносибирский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; эндем; декоративное. **11.**

15. (222). *S. tortuosum* Ledeb. – Ж. извилистая: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; средиземноморский; петрофитный; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; медоносное. **11, 12.**

#### Семейство 48. Sambucaceae Borkh. — Бузиновые

1. (223). *Sambucus ebulus* L. – Бузина травяная: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное. **2**

2. (224). *S. nigra* L. – Б. черная: К.; фанерофит; мезофит; палеарктический; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **2, 3, 4, 5.**

#### Сем. 49. Viburnaceae Rafin. – Калиновые

1. (225). *Viburnum lantana* L. – Калина гордовина: К.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; редко; реликт; лекарственное. **12.**

2. (226). *V. opulus* L. – К. обыкновенная: К.; фанерофит; мезофит; евро-сибирский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса;

рассеянно; лекарственное. **7**.

#### Семейство 50. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные

1. (227). *Lonicera caprifolium* L. – Жимолость душистая: К.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; часто; реликт; декоративное. **3, 4, 7**.

2. (228). *L. caucasica* Pall. – Ж. кавказская: К.; фанерофит; мезофит; кавказский; опушечно-лесной; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; медоносное, декоративное. **2, 3, 6**.

#### Семейство 51. Dipsacaceae Eaton – Ворсянковые

1. (229). *Dipsacus laciniatus* L. – Ворсянка разрезная: Дв.; гемикриптофит; мезофит; общедревнесредиземноморский; луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **1, 8**.

2. (230). *Scabiosa bipinnata* C. Koch – Скабиоза дваждыперистая: Мн.; гемикриптофит; кавказский; луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **8**.

3. (231). *S. caucasica* Vieb. – С. кавказская: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; обычно; декоративное. **10, 12**.

4. (232). *S. ochroleuca* L. – С. бледно-жёлтая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; понтичско-южносибирский; луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **7**

#### Семейство 52. Valerianaceae Batsch – Валериановые

1. (233). *Valeriana alliariifolia* Adam – Валериана чесночницелистная: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; кавказско-эвксинский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; часто; реликт; декоративное. **2, 11**.

2. (234). *V. officinalis* L. – В. лекарственная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; опушечно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; часто; лекарственное. **2**.

#### Семейство 53. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые

1. (235). *Campanula alliariifolia* Willd. – Колокольчик чесночницелистный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитно-опушечный; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **4, 11**.

2. (236). *C. collina* Sims. – К. холмовой: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; от среднего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **10, 12**.

3. (237). *C. glomerata* L. – К. сборный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; петрофитно-луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **8, 10.**

4. (238). *C. longistyla* Fomin – К. длинностолбиковый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитно-луговой; от среднего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **11, 12.**

5. (239). \**C. pendula* M. Vieb. – К. поникший: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитный; средний пояс; редко; декоративное. **11.**

6. (240). *C. rapunculoides* L. – К. рапунциелистный: Дв.; гемикриптофит; ксеромезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от нижнего до среднего пояса; часто; реликт; декоративное. **2, 3, 6.**

7. (241). *C. sibirica* L. – К. сибирский, высокий: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; евро-сибирский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **11.**

8. (242). *C. tridentata* Schreb. – К. трехзубый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; альпийский пояс; обычно; декоративное. **12.**

#### Семейство 54. Asteraceae Bercht. & J. Presl – Астровые

1. (243). *Achillea biserrata* Vieb. – Тысячелистник дваждыпильчатый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; декоративное. **2, 4.**

2. (244). *A. millefolium* L. – Т. обыкновенный: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; евро-сибирский; луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; лекарственное. **8, 9.**

3. (245). *Ambrosia artemisiifolia* L. – Амброзия полыннолистная: О.; терофит; ксерофит; плюрирегиональный; сорный; от нижнего до среднего пояса; обычно. **1, 9.**

4. (246). *Anthemis marschalliana* Willd. – Пупавка Маршалла: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитный; альпийский пояс; обычно; эндем; декоративное. **11, 12.**

5. (247). *Artemisia absinthium* L. – Полынь горькая: Пк.; хамефит; мезоксерофит; палеарктический; сорный; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; лекарственное. **1, 9.**

6. (248). *A. austriaca* Jacq. – П. австрийская: Мн.; криптофит (геофит); ксерофит; понтическо-южносибирский; степной; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **9.**

7. (249). *Aster alpinus* L. – Астра альпийская: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; евро-сибирский; петрофитно-луговой; альпийский пояс; обычно; декоративное. **12.**

8. (250). *Carduus acanthoides* L. – Чертополох колючий: Дв.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; сорный; от нижнего до субальпийского пояса; обычно. **9, 10.**

9. (251). *Centaurea phrygia* L. ssp. *salicifolia* (M. Bieb. ex Willd.) Mikheev – Василёк иволистный: Мн.; криптофит (геофит); кавказский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **10, 12.**

10. (252). *Cicerbita racemosa* (Willd.) Beauverd. – Цицербита кистевидная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; субальпийский пояс; рассеянно. **12.**

11. (253). *Doronicum oblongifolium* DC. – Дороникум продолговатолистный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; средиземноморский; луговой; субальпийский пояс; рассеянно; эндем. **12.**

12. (254). *Erigeron alpinus* L. – Мелколепестник альпийский: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; петрофитно-луговой; альпийский пояс; обычно; декоративное. **12.**

13. (255). *E. caucasicus* Steven – М. кавказский: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; кавказский; луговой; альпийский пояс; рассеянно; эндем; декоративное. **12.**

14. (256). *E. orientalis* Boiss. – М. восточный: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; кавказский; луговой; лапишистофит; от субальпийского до альпийского пояса; рассеянно; декоративное. **12.**

15. (257). *Eupatorium cannabinum* L. – Посконник коноплевидный: Мн.; криптофит (геофит); гигромезофит; кавказско-европейский; сорный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; ядовитое. **1, 9.**

16. (258). *Hieracium umbellatum* L. – Ястребинка зонтичная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно. **8, 10.**

17. (259). *Inula ensifolia* L. – Деясил мечелистный: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; понтичско-южносибирский; лугово-степной; от среднего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **10, 11.**

18. (260). *I. helenium* L. – Д. высокий: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **1, 8.**

19. (261). *I. magnifica* Lipsky – Д. великолепный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; эвксинский; опушечно-лесной; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; эндем; декоративное. **8, 10.**

20. (262). *I. orientalis* Lam. – Д. восточный: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; кавказский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; рассеянно; эндем; декоративное. **12.**

21. (263). *Jurinea arachnoidea* Bunge – Наголоватка паутинистая: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; понтическо-южносибирский; степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; эндем; декоративное. **9, 10.**

22. (264). *Lactuca tatarica* (L.) С.А. Меу. – Латук татарский: Мн.; криптофит (геофит); мезоксерофит; палеарктический; сорный; от нижнего до субальпийского пояса; обычно. **1, 9.**

23. (265). *Lapsana communis* L. – Бородавник обыкновенный: О.; терофит; мезофит; евро-сибирский; сорно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно. **1, 9, 10.**

24. (266). *Leontodon hispidus* L. – Кульбаба шетинистая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; луговой; от среднего до альпийского пояса; обычно. **10, 12.**

25. (267). *Leucanthemum vulgare* Lam. – Нивяник обыкновенный: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; евро-сибирский; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **1, 2, 10.**

26. (268). *Matricaria chamomilla* L. [*M. recutita* L.] – Ромашка ободранная: О.; терофит; мезофит; голарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное. **1, 9.**

27. (269). *Petasites albus* (L.) Gaertn. – Белокопытник белый: Мн.; криптофит (геофит); гигромезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **2, 3, 7.**

28. (270). *P. hybridus* (L.) Gaertn., В. Меу. & Scherb. – Белокопытник гибридный: Мн.; криптофит (геофит); гигромезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; лекарственное. **2, 3, 7.**

29. (271). *Pilosella officinarum* F.W. Schultz & Sch. Bip. [*Hieracium pilosella* L.] – Ястребиночка волосистая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно. **8, 10, 12.**

30. (272). *Psephellus dealbatus* (Willd.) С. Koch – Пцефеллюс подбеленный: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; кавказский; петрофитно-луговой; от среднего до субальпийского пояса; обычно; эндем; декоративное. **10, 11, 12.**

31. (273). *Senecio jacobaea* L. – Крестовник Якова: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; евро-сибирский; сорно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **1, 8, 9.**

32. (274). *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip. [*Pyrethrum corymbosum* (L.) Willd.] – Пижма щитковая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; петрофитно-опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского

пояса; обычно; декоративное. **8, 9, 11.**

33. (275). *T. parthenifolium* (Willd.) Sch. Bip. [*Pyrethrum parthenifolium* Willd.] – П. девичьелистная: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; общедревнесредиземноморский; петрофитно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **10, 11, 12.**

34. (276). *T. poteriifolium* (Ledeb. ex Nordm.) Grierson [*Pyrethrum poteriifolium* Ledeb.] – П. черноголовниковая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; эксинский; петрофитно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; эндем; декоративное. **8, 9.**

35. (277). *T. vulgare* L. – П. обыкновенная: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; палеарктический; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **8, 9.**

36. (278). *Taraxacum confusum* Schischk. – Одуванчик спутанный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; субальпийский пояс; обычно; эндем; декоративное. **12.**

37. (279). *T. officinale* Wigg. – О. лекарственный: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; палеарктический; сорный; от нижнего до среднего пояса; обычно; лекарственное. **1, 2, 8, 9.**

38. (280). *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg – Телекия красивейшая: Мн.; гемикриптофит; гигрофит; кавказско-европейский; лугово-лесной; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; реликт; декоративное. **10, 12.**

39. (281). *Tripleurospermum nathaliae* Zernov – Трехреберник Натальи: Мн.; гемикриптофит; мезофит; эксинский; петрофитный; средний пояс; изредка. **11.**

40. (282). *Tussilago farfara* L. – Мать-и-мачеха обыкновенная: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; палеарктический; лугово-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **6, 11.**

#### Семейство 55. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые

1. (283). *Cerinth glabra* Mill. – Восковник голый: Мн.; гемикриптофит; гигрофит; кавказско-европейский; луговой; субальпийский пояс; обычно; декоративное. **10, 12.**

2. (284). *Echium vulgare* L. – Синяк обыкновенный: Дв.; гемикриптофит; ксерофит; евро-сибирский; сорный; от нижнего до субальпийского пояса; часто; медоносное. **1, 8, 9.**

3. (285). *Huynhia pulchra* (Willd. ex Roemer & Schultes) Greuter & Burdet – Гуния красивая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; средиземноморский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; обычно; декоративное. **12.**

4. (286). *Myosotis alpestris* F.W. Schmidt. – Незабудка альпийская: Мн.;

гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; луговой; от субальпийского до альпийского пояса; обычно; декоративное. **12.**

5. (287). *M. micrantha* Pall. ex Lehm. – Н. мелкоцветковая: О.; терофит; мезофит; палеарктический; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно. **6, 12.**

6. (288). *M. ramosissima* Pallas ex Schult. – Н. ветвистая: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; европейско-средиземноморский; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **8.**

7. (289). *M. sylvatica* Ehrh. ex Hoffm – Н. лесная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; кустарниково-лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно. **2, 3, 4.**

8. (290). *Symphytum asperum* Lerech. – Окопник шероховатый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; эндем; декоративное. **2, 3, 4.**

9. (291). *S. officinale* L. – О. лекарственный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; лугово-лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; медоносное, лекарственное. **1, 3, 8.**

#### Семейство 56. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые

1. (292). *Calystegia sepium* (L.) R. Br. – Повой заборный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; голарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; обычно; декоративное. **1, 2.**

2. (293). *C. silvatica* (Kit.) Griseb. – П. лесной: Мн.; гемикриптофит; мезогрофит; средиземноморский; лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **4, 6.**

3. (294). *Convolvulus arvensis* L. – Вьюнок полевой: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; плюрирегиональный; сорный; от нижнего до среднего пояса; обычно. **1, 8, 9.**

#### Семейство 57. Solanaceae Juss. – Паслёновые

1. (295). *Hyoscyamus niger* L. – Белена чёрная: Дв.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; сорный; от нижнего до среднего пояса; изредка; лекарственное, ядовитое. **1, 8, 9.**

2. (296). *Scopolia carniolica* Jacq. – Скополия карниольская: Мн.; гемикриптофит; мезофит; понтический; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; лекарственное, ядовитое. **2, 3, 7.**

3. (297). *Solanum nigrum* L. – Паслён чёрный: О.; терофит; мезофит; палеарктический; сорный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; ядовитое. **1, 9.**

Семейство 58. Oleaceae Hoffm. et Link – Маслинные

1. (298). *Fraxinus excelsior* L. – Ясень высокий, или обыкновенный: Д.; фанерофит; ксеромезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; техническое, декоративное. **4, 7.**

2. (299). *Ligustrum vulgare* L. – Бирючина обыкновенная: К.; фанерофит; мезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; обычно; реликт; декоративное. **7.**

Семейство 59. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые

1. (300). *Lathraea squamaria* L. – Петров крест чешуйчатый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-европейский; лугово-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; единично; паразит. **7.**

2. (301). *Linaria genistifolia* (L.) Mill. – Льянка дроколистная: Мн.; гемикриптофит; мезоксерофит; кавказский; лугово-степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **8, 9, 10.**

3. (302). *Melampyrum arvense* L. – Марьянник полевой: О.; терофит; ксеромезофит; понтичеко-южносибирский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно. **1, 8.**

4. (303). *M. caucasicum* Bunge – М. кавказский: О.; терофит; мезофит; кавказский; луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; часто; эндем; лекарственное. **8, 10.**

5. (304). *Orobanche colorata* C. Koch – Заразиха покрашенная: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; средиземноморский; кустарниково-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; паразит. **8, 10.**

6. (305). *O. elatior* Sutt. – З. большая: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; средиземноморский; кустарниково-лесной; средний пояс; обычно; паразит. **8, 9.**

7. (306). *O. owerinii* (G. Beck.) G. Beck. – Заразиха Оверина: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; средиземноморский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; паразит. **10, 12.**

8. (307). *Scrophularia nodosa* L. – Норичник шишковатый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; опушечно-лесной; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **2, 3, 5.**

9. (308). *S. rupestris* Vieb. et Willd – Н. скальный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; ирано-туранский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **11.**

10. (309). *Verbascum chaixii* subsp. *austriacum* (Schott ex Roem. & Schult.) Nayek – Коровяк австрийский: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; лугово-степной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно;

декоративное. **8, 10.**

11. (310). *V. pyramidatum* M. Vieb. – К. пирамидальный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; лугово-степной; от верхнего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **1, 8, 9.**

12. (311). *Veronica chamaedrys* L. – Вероника дубравная: О.; терофит; гигромезофит; евро-сибирский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; декоративное. **4.**

13. (312). *V. longifolia* L. – В. длиннолистная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; лугово-лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно. **7, 8.**

14. (313). *V. spicata* L. – В. колосистая: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; западно-палеарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; декоративное. **8, 9.**

#### Семейство 60. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые

1. (314). *Plantago atrata* Норре – Подорожник чернеющий: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; кормовое. **8.**

2. (315). *P. lanceolata* L. – П. ланцетный: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; палеарктический; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное. **1, 9.**

3. (316). *P. major* L. – П. большой: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; сорно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; лекарственное. **1, 8, 9.**

4. (317). *P. media* L. – П. средний: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; евро-сибирский; лугово-степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **10.**

5. (318). *P. urvillei* Opiz – П. Урвилла: Мн.; гемикриптофит; мезофит; понтичеко-южносибирский; лугово-степной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; декоративное. **8, 10.**

#### Семейство 61. Lamiaceae Martinov – Яснотковые (Губоцветные)

1. (319). *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy – Душевка полевая: О. или Дв.; терофит или гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; петрофитно-степной; от нижнего до среднего пояса; часто; лекарственное, техническое. **11.**

2. (320). *Betonica macrantha* C. Koch. – Буквица крупноцветковая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; луговой; субальпийский пояс; обычно; медоносное. **12.**

3. (321). *B. officinalis* L. – Б. лекарственная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского

пояса; рассеянно; лекарственное, медоносное. **4, 8, 9.**

4. (322). *Glechoma hederacea* L. – Будра плющевидная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; медоносное. **1, 4, 7.**

5. (323). *Lamium album* L. – Яснотка белая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **1, 9.**

6. (324). *L. purpureum* L. – Я. пурпурная: О.; терофит; мезоксерофит; евро-сибирский; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; обычно; медоносное. **1, 8.**

7. (325). *Leonurus villosus* Desf. [*L. quinquelobatus* Gilib.] – Пустырник пятилопастный; Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; сорно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; медоносное, лекарственное. **8, 10.**

8. (326). *Mentha longifolia* (L.) Huds. – Мята длиннолистная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; западно-палеарктический; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное, медоносное. **1, 8, 10.**

9. (327). *Origanum vulgare* L. – Душица обыкновенная: Мн.; гемикриптофит; голарктический; мезофит; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное, пряное. **1, 8.**

10. (328). *Prunella vulgaris* L. – Черноголовка обыкновенная: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **7, 8, 9.**

11. (329). *Salvia glutinosa* L. – Шалфей железистый: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; кавказско-европейский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт. **7.**

12. (330). *Salvia nemorosa* ssp. *tesquicola* (Klokov & Pobed.) Soó [*S. tesquicola* Klokov & Pobed.] – Шалфей остепнённый: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; понтичско-южносибирский; лугово-степной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно. **8, 9.**

13. (331). *S. verticillata* L. – Ш. мутовчатый: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; понтичско-южносибирский; луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; декоративное. **8, 9.**

14. (332). *Scutellaria altissima* L. – Шлемник высочайший: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; опушечно-лесной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; обычно; реликт; медоносное. **2, 3.**

15. (333). *Stachys germanica* L. – Чистец германский: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; евро-сибирский; луговой; от среднего до

субальпийского пояса; обычно; медоносное, декоративное. **8, 9, 10.**

16. (334). *S. recta* L. – Ч. прямой: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; понтический; степной; от нижнего до среднего пояса; рассеянно. **8, 10.**

17. (335). *Teucrium chamaedrys* L. – Дубровник обыкновенный: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; общедревнесредиземноморский; степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; медоносное, декоративное. **8, 10.**

18. (336). *Thymus collinus* M. Vieb. – Чабрец холмовой: Пкч.; хамефит; ксерофит; кавказский; петрофитно-степной; от среднего до субальпийского пояса; изредка; декоративное. **11, 12.**

19. (337). \**Th. marschallianus* Willd. – Ч. Маршалла: Пкч.; хамефит; ксерофит; понтичеко-южносибирский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; лекарственное. **11.**

20. (338). *Th. nummularius* Vieb. – Ч. монетчатый: Пкч.; хамефит; ксеромезофит; кавказский; петрофитный; от среднего до субальпийского пояса; обычно; эндем; лекарственное. **11, 12.**

#### Семейство 62. Verbenaceae J.St.-Hil. – Вербеновые

1. (339). *Verbena officinalis* L. – Вербена лекарственная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; плюрирегиональный; сорно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; лекарственное. **1**

#### Семейство 63. Rubiaceae Juss. – Мареновые

1. (340). *Galium brachyphyllum* Schult. & Schult.f. – Подмаренник коротколистный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; редко; эндем; декоративное. **11.**

2. (341). *G. mollugo* L. – П. мягкий: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; луговой; от нижнего до среднего пояса; часто. **8, 9.**

3. (342). *G. odoratum* (L.) Scop. – П. душистый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; лесной; от среднего до верхнего лесного пояса; обычно; кормовое, медодосное. **2, 3, 5, 6.**

4. (343). *G. valantioides* Vieb. – П. валантиевидный: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; кавказский; луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; эндем; декоративное. **11.**

5. (344). *G. verum* L. – П. обыкновенный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; опушечно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; часто; кормовое, медонос. **1, 8, 9.**

#### Семейство 64. Arosynaceae Juss. – Кутровые

1. (345). *Vinca herbacea* Waldst. Et Kit. – Барвинок обыкновенный: Мн.; гемикриптофит; ксеромезофит; понтичеко-южносибирский; опушечный; от

нижнего до среднего пояса; изредка; декоративное. **3, 5, 6.**

2. (346). *Vincetoxicum scandens* Somm. – Ластовень цепляющийся: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказский; опушечно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; ядовитое. **4, 7.**

#### Monocotyledones – Однодольные

##### Подкласс Liliidae – Лилииды

##### Семейство 65. Araceae Juss. — Аронниковые

1. (347). *Arum orientale* M. Vieb. – Аронник восточный: Мн.; криптофит, геофит; мезофит; восточномедитерранейский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; изредка; декоративное, ядовитое. **2, 3.**

##### Семейство 66. Alismataceae Vent. – Частуховые

1. (348). *Alisma plantago-aquatica* L. – Частуха подорожниковая: Мн.; криптофит; гигрофит; плюрирегиональный; околородный; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; кормовое. **1.**

##### Семейство 67. Melanthiaceae – Мелантиевые

1. (349). *Veratrum lobelianum* Bernh. – Чемерица Лобеля: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; опушечно-луговой; от верхнего лесного до субальпийского пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **12.**

##### Семейство 68. Trilliaceae – Триллиевые

1. (350). *Paris incompleta* M. Vieb. – Вороний глаз неполный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; реликт; ядовитое. **2, 3, 5, 7.**

2. (351). *P. quadrifolia* L. – В. г. четырехлисточковый: Мн.; гемикриптофит или криптофит; мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; ядовитое. **2, 4, 6.**

##### Семейство 69. Liliaceae Juss. – Лилейные

1. (352). *Gagea lutea* (L.) Ker.-Gawl. – Гусиный лук желтый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; лугово-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **8, 12.**

2. (353). \**Lilium monadelphum* M. Vieb. – Лилия однобратственная: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказский; луговой; субальпийский пояс; часто; эндем; декоративное. **12.**

##### Семейство 70. Alliaceae Herb. – Луковые

1. (354). *Allium ursinum* L. – Лук медвежий: Мн.; криптофит (геофит);

мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; пищевое, лекарственное. **5, 6.**

2. (355). *A. victorialis* L. – Л. победный: Мн.; криптофит (геофит); гигромезофит; кавказско-европейский; луговой; субальпийский пояс; рассеянно; пищевое, декоративное. **10, 12.**

#### Семейство 71. Convallariaceae Horan. – Ландышевые

1. (356). *Polygonatum glaberrimum* C. Koch. – Купена голая: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; голарктический; лесной; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное. **2, 4, 6.**

2. (357). *P. multiflorum* (L.) All. – К. многоцветковая: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; голарктический; опушечно-лесной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **2, 3.**

3. (358). *P. verticillatum* (L.) All. – К. мутовчатая: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; лекарственное, декоративное. **3, 6.**

#### Семейство 72. Ruscaceae Spreng. – Иглицевые

1. (359). *Ruscus aculeatus* L. – Иглица колючая: вечнозеленый: Кч.; криптофит (геофит); мезофит; средиземноморский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; изредка; реликт; декоративное. **2, 3, 5.**

#### Семейство 73. Iridaceae Juss. – Ирисовые (Касатиковые)

1. (360). *Gladiolus imbricatus* L. – Шпажник черепитчатый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; палеарктический; опушечно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; декоративное. **1, 8.**

2. (361). *Iris sibirica* L. – Касатик сибирский: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; луговой; от верхнего до субальпийского пояса; редко; декоративное. **10, 12.**

#### Семейство 74. Orchidaceae Juss. – Орхидные

1. (362). **\*\**Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.** – Анакамптис пирамидальный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; средиземноморский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; декоративное. **10.**

2. (363). **\*\**Cephalanthera rubra* (L.) Rich.** – Пыльцеголовник красный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-европейский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; редко; декоративное. **2, 6.**

3. (364). *Epipactis helleborine* (L.) Crantz. – Дремлик широколистный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; палеарктический; опушечно-лесной; от

нижнего до верхнего лесного пояса; редко; декоративное. **3, 6.**

4. (365). \**Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. – Кокушник длиннорогий: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; луговой; от среднего до субальпийского пояса; обычно; декоративное. **10, 12.**

5. (366). \*\**Limodorum abortivum* (L.) Sw. – Лимодорум недоразвитый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; декоративное. **2, 6.**

6. (367). \**Listera ovata* (L.) R. Br. – Тайник яйцелистный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; редко; декоративное. **2, 5, 6.**

7. (368). \**Neottia nidus-avis* (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная: Мн.; криптофит (геофит); гигромезофит; западно-палеарктический; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; декоративное. **2, 5, 6.**

8. (369). \**Platanthera bifolia* (L.) Rich. – Любка двулистная: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; редко; декоративное. **2, 6.**

#### Семейство 75. Typhaceae Juss. – Рогозовые

1. (370). *Typha angustifolia* L. – Рогоз узколистный: Мн.; криптофит (геофит); гигрофит; плюрирегиональный; болотный; от нижнего до верхнего лесного пояса; изредка; кормовое. **1, 7.**

2. (371). *T. latifolia* L. – Р. широколистный: Мн.; криптофит (геофит); гигрофит; голарктический; болотный; от нижнего до верхнего лесного пояса; изредка; кормовое. **1, 7.**

#### Семейство 76. Cyperaceae Juss. – Осоковые

1. (372). *Carex acutiformis* Ehrh. – Осока заострённая: Мн.; гемикриптофит или криптофит; гигрофит; не определён; прибрежно-водный; от нижнего до среднего пояса; изредка. **1, 7.**

2. (373). *C. caucasica* Stev. – О. кавказская: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; лугово-лесной; от среднего до субальпийского пояса; рассеянно; кормовое. **10, 12.**

3. (374). *C. hirta* L. – О. мохнатая: Мн.; гемикриптофит или криптофит; мезофит; кавказско-европейский; псаммофильно-луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно. **8.**

4. (375). *C. leporina* L. – О. заячья: Мн.; гемикриптофит или криптофит; мезофит; евро-сибирский; луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно. **8, 9.**

5. (376). *C. melanostachya* Vieb. et Willd. – О. чёрноколосая: Мн.; гемикриптофит; мезогигрофит; палеарктический; болотный; от нижнего до

верхнего лесного пояса; рассеянно; кормовое. **8, 9, 10.**

6. (377). *C. pallescens* L. – О. бледноватая: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; евро-сибирский; опушечно-луговой; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; кормовое. **7, 8.**

7. (378). *C. remota* L. – О. раздвинутая: Мн.; гемикриптофит или криптофит; гигромезофит; евро-сибирский; лугово-болотный; от нижнего до среднего пояса; рассеянно; кормовое. **7, 8.**

8. (379). *C. riparia* Curt. – О. береговая: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; палеарктический; болотный; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; кормовое. **7, 8.**

9. (380). *C. sylvatica* Huds. – О. лесная: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; кормовое. **2, 3, 7.**

10. (381). *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla [*Scirpus lacustris* L.] – Схеноплектус озерный: Мн.; гемикриптофит; гигрофит; панбореальный; прибрежно-водный; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; кормовое. **1, 7.**

11. (382). *Scirpus sylvaticus* L. – Камыш лесной: Мн.; криптофит (геофит); гигрофит; евро-сибирский; болотный; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; кормовое. **2, 6, 7.**

#### Семейство 77. Poaceae Barnhart – Злаковые

1. (383). *Agrostis capillaris* L. [(*A. tenuis* Sibth., *A. vulgaris* With.)]– Полевица волосовидная: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; опушечный; от нижнего до верхнего лесного пояса; нередко; кормовое. **8, 9, 10.**

2. (384). *Brachypodium rupestre* (Host) Roem. & Schult. – Коротконожка скальная: Мн.; криптофит (геофит); ксеромезофит; кавказско-европейский; петрофитно-степной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно; декоративное. **11.**

3. (385). *Briza elatior* Sibth. & Sm. – Трясунка высокая: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; кавказско-европейский; петрофитно-луговой; от нижнего до среднего пояса; часто; декоративное. **10, 11.**

4. (386). *Bromopsis benekenii* (Lange) Holub – Кострец Бенекена: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; рассеянно. **2, 3, 4.**

5. (387). *B. inermis* (Leys.) Holub – К. безостый: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; луговой; от нижнего до верхнего лесного пояса; часто; кормовое. **1, 8, 9.**

6. (388). *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth. – Вейник тростниковидный: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; часто; кормовое. **4, 8, 10.**

7. (389). *C. epigeios* (L.) Roth. – В. наземный: Мн.; криптофит (геофит); мезоксерофит; палеарктический; луговой, от нижнего до верхнего лесного пояса; часто; кормовое. **1, 9.**

8. (390). *Dactylis glomerata* L. – Ежа сборная: Мн.; криптофит (геофит); гигромезофит; западно-палеарктический; опушечно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; кормовое. **4, 7, 8, 10.**

9. (391). *Deschampsia cespitosa* (L.) Beauv. – Щучка дернистая: Мн.; гемикриптофит; гигромезофит; голарктический; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; часто; кормовое. **10, 12.**

10. (392). *Elymus caninus* (L.) L. – Пырейник собачий: Мн.; криптофит (геофит); мезофит; евро-сибирский; лугово-степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; кормовое. **9, 10, 12.**

11. (393). *Elytrigia repens* (L.) Nevski – Пырей ползучий: Мн.; криптофит (геофит); мезоксерофит; палеарктический; сорно-луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно; кормовое. **8, 9, 10.**

12. (394). *Festuca ovina* L. – Овсяница овечья: Мн.; гемикриптофит; ксерофит; кавказско-европейский; петрофитный; от нижнего до среднего пояса; часто; кормовое. **8, 11.**

13. (395). *F. pratensis* Huds. – О. луговая: Мн.; гемикриптофит; мезофит; палеарктический; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; кормовое. **1, 7, 8.**

14. (396). *Holcus lanatus* L. – Бухарник шерстистый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; кавказско-европейский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; рассеянно; декоративное; кормовое. **10, 12.**

15. (397). *Koeleria cristata* (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый: Мн.; гемикриптофит; мезофит; голарктический; лугово-степной; от нижнего до субальпийского пояса; часто; кормовое. **8, 9.**

16. (398). *Phleum phleoides* (L.) Karst. – Тимофеевка степная: Мн.; криптофит (геофит); мезоксерофит; палеарктический; лугово-степной; от нижнего до субальпийского пояса; обычно. **8, 9.**

17. (399). *Ph. pratense* L. – Т. луговая: Мн.; криптофит (геофит); мезоксерофит; евро-сибирский; луговой; от нижнего до субальпийского пояса; обычно. **8, 9, 10.**

18. (400). *Poa nemoralis* L. – Мятлик дубравный: Мн.; гемикриптофит; мезофит; евро-сибирский; опушечно-лесной; от нижнего до верхнего лесного пояса; обычно; кормовое. **4, 6.**

**Фотоизображения некоторых видов флоры**



*Рис. 1 – Борец носатый*



*Рис. 2 – Калина гордовина*



*Рис. 2 – Рододендрон понтийский*




*Рис. 3 – Телекия красивейшая*



*Рис. 4 – Вороний глаз неполный*



*Рис. 6 – Любка двулистная*



*Рис. 7 – Лилия однобратственная*



*Рис. 8 – Морозник кавказский*



*Рис. 9 – Костенцы: А – костенец северный Б – костенец волосовидный*



*Рис. 10 – Шпажник черепитчатый*



*Рис. 11 – Гравилат речной*



*Рис. 12 – Водосбор олимпийский*




*Рис. 13 – Ветреница пучковатая*



*Рис. 14 – Гуния красивая*



*Рис. 15 – Грушанка круглолистная*



*Рис. 16 – Скополия карниольская*



*Рис. 17 – Буквица крупноцветковая*



*Рис. 18 – Очный цвет полевой*



*Рис. 19 – Петров крест чешуйчатый*